

鮮度保持に!!!
カルシウム欠乏予防に!!!

カルシウム+マルトシルトレハロース液肥

ライムショット

カルシウム(CaO) 10%含有



ライムショットの鮮度保持効果

※3日間隔で500倍液を6回散布後に自然乾燥

ライムショット

無施用



トマトの尻腐れ症



ハクサイの芯腐れ症



キュウリの落下傘症



チンゲンサイの葉先枯れ症



ナシの日焼け・蜜症

ケース：10kg入り(80)

多木肥料

ライムショット


ケース：10kg入り(8ℓ)

1 成分量

成分	(%)						
	カルシウム (CaO)	苦土	マンガン	ホウ素	マルトシル トレハロース	pH	比重
含有量	10	1	0.5	0.5	5	4.3	1.25

2 特長

- 吸収が良い水溶性のカルシウムを含んでいます。
- カルシウムの他に苦土、マンガン、ホウ素などの微量要素を含んでいます。
- マルトシルトレハロースは糖の一種であり、保湿効果や養分吸収を促進します。



3 ライムショットの効果

- カルシウム欠乏対策・・・ライムショットは、根・葉から速やかに吸収されます。
- 収穫後の日持ち向上・・・カルシウムは植物の老化ホルモンを抑える働きがあり、さらにマルトシルトレハロースは生産物の保湿効果を示します。
- 病気の抵抗性向上・・・カルシウム・マンガンを吸収すると耐病性が高まります。
- 軟弱徒長の改善・・・カルシウムで植物がしっかり丈夫になります。

4 使用方法

●葉面散布

作物	施肥時期	希釈倍数	散布回数
野菜	生育全般、石灰欠乏時	500～800倍	3～5回
果樹	肥大中期～後期、石灰欠乏時	300～500倍	3～5回
花卉	生育全般、石灰欠乏時	500～800倍	3～5回
水稻	出穂期	300～500倍	1～2回
芝草	6月～9月	100～200倍	3～5g / m ² 3～5回

●灌水施肥（100～200倍希釈で施肥）

作物	施肥時期	施肥量
野菜	生育全般、石灰欠乏時	5～10kg / 10a
果樹	肥大中期～後期、石灰欠乏時	10～20kg / 10a
花卉	生育全般、石灰欠乏時	5～10kg / 10a
水稻	育苗期	1箱当たり1～2g

取扱い上の注意

- ◆眼に入らないようご注意ください。眼に入ったときは、すぐに水でよく洗い流して下さい。
- 「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

- 保管方法 ◆50℃以上または0℃以下の所で長く保管しないで下さい。
- ◆密閉して幼児の手の届かない涼しい所に保管して下さい。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地